Mercepton

USO VETERINÁRIO
Antitóxico
INJETÁVEL

Fórmula:
Cada 100 mL contém:

Acetil D-L-metionina	5,00 g
Cloreto de colina	2,00 g
Cloridrato de tiamina	1,00 g
Cloridrato de piridoxina	0,04 g
Cloridrato de L-arginina	0,60 g
Riboflavina	0,02 g
Nicotinamida	0,50 g
Pantotenato de cálcio	0,20 g
Glicose	20,00 g
Veículo q.s.p	100 mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS E CAPRINOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO.
LEITE - CARÊNCIA ZERO.
EQUINOS E SUÍNOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Indicações:
Mercepton é a associação de 3 notáveis agentes lipotrópicos e antitóxicos, pelo estímulo das defesas do organismo contra agentes hepatotóxicos, adjuvados pela glicose, com a sua ação dinamogênica e também protetora do parênquima hepático contra agentes nocivos e vitaminas do Complexo B que, ao mesmo tempo que aumentam o mecanismo protetor natural, estimulam o poder transmetilante do fígado.

Suas principais indicações são:
Hepatoprotetoras, nas auto-intoxicações e intoxicações causadas pela ingestão de forragens deterioradas, plantas venenosas, envenenamentos por medicamentos tomados acidentalmente ou em doses excessivas (vermífugos, inseticidas, líquidos carrapaticidas, tetracloreto de carbono, etc), sequelas de tratamentos mais prolongados com antibióticos, sulfas e outros quimioterápicos, etc. Como agente lipotrópico, nas degenerações das células hepáticas e infiltrações gordurosas. No tratamento e prevenção das hipovitaminoses B. **Mercepton** pode ser usado como diluente de antibióticos, em lugar de água destilada.

Modo de usar e dosagem:
Aplicar em injeções intramusculares ou endovenosas.
Animais de grande porte (bovinos, equinos e muares): de 20 até 100 mL diários.
Animais de médio porte (potros, bezerros e cabras): de 10 até 30 mL diários.
Animais de pequeno porte (cães, leitões e gatos): de 2 até 10 mL diários.
Repetir diariamente, seguindo a orientação do Médico Veterinário.
Não apresenta contraindicações.

Apresentação: Frasco com 20 e 100 mL.

Conservar em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 0125 em 25/06/70.
Responsável Técnica: Drª Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.

BRAVET
Proprietário e Fabricante:
LABORATÓRIO BRAVET LTDA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340
SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19
EE

Compartilhar

Onde encontrar este produto? (/onde-encontrar/produto/penfort-ppu/)

produto
Essencial

(/produtos/todos/essencial/)

(/media/uploads/produtos/2019/penfortppu-novo.png)

Penfort® PPU

Antibiótico 3 em 1 pronto para uso.

Terapêuticos

- Combinação de três antibióticos em um único produto.
- Amplo espectro de ação: atua sobre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.
- Prático: opção de tratamento em dose única. Frasco de 50 mL multidose.
- Econômico: trata até 400 kg de peso vivo.

Suínos:

Pronto para o uso.

Penfort® PPU é a combinação de três antimicrobianos em um único produto. Amplo espectro de ação atuando sobre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.

Fórmula

) mL contém:

ı G procaína ..... 10.000.000 UI

Privacidade - Termos

Penicilina G benzatina ..... 10.000.000 UI

Dihidroestreptomicina (Sulfato) ..... 20,00 g

Veículo q.s.p. ..... 100,00 mL

Indicações:

Penfort® PPU é um produto injetável indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas pelos seguintes agentes etiológicos susceptíveis:

Bovinos - Abcessos e infecções do trato gastrointestinal, respiratório e reprodutivo, causadas por: *Trueperella pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Moraxella bovis, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae*.

Suínos - Abcessos e infecções do trato gastrointestinal, respiratório e urinário, causadas por: *Proteus mirabilis, Shigella flexneri, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes*.

Equinos - Abcessos e infecções do trato gastrointestinal e respiratório, causadas por: *Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella multocida, Clostridium perfringens.*

Modo de uso e dosagem:

Penfort® PPU é indicado para bovinos, suínos e equinos.

Produto injetável, pronto para uso, deve ser aplicado por via intramuscular profunda, utilizando agulhas com 25 a 30 mm de comprimento.

Deve-se respeitar o volume máximo por local de aplicação de 10 mL, caso o volume seja superior recomenda-se dividir em dois ou mais locais de aplicação.

A dosagem recomendada é 1 mL do produto para cada 8 kg de peso corporal, o que corresponde a 25.000 UI de Penicilina e 25 mg de Sulfato de Dihidroestreptomicina por kg de peso corporal. Tratamento em dose única.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 38 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 18 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

SUÍNOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

EQUÍDEOS (*Equus caballus*/CAVALOS)

ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.

Privacidade - Termos

Confira mais informações sobre esse produto na bula ou no texto técnico em “Materiais”.

Última atualização: 27/08/2021

Assista aos nossos vídeos e saiba mais sobre os produtos Ourofino.

Penfort® PPU

Penfort® PPU | Suínos

Penfor

Apresentações:

Privacidade - Termos

Frasco com 50 mL

(/media/uploads/produtos/2019/penfortppu-novo.png)

Materiais:

BULA (/produtos/downloads/879/) FISPQ (/produtos/downloads/702/)

Onde encontrar este produto? (/onde-encontrar/produto/penfort-ppu/)

Dúvidas ou mais informações?

Preencha o formulário abaixo para nosso especialista entrar em contato com você.

Nome:

E-mail:

Celular:

Mensagem:

receber informações, novidades e lançamentos da Ourofino no meu e-mail.

Privacidade - Termos

☐ **Li e aceito os termos da política de privacidade (https://www.ourofinosaudeanimal.com/politica-de-privacidade/).**

Enviar

Compartilhar

Nosso Propósito (/reimaginar/nosso-proposito/)

Produtos (/produtos/)

Ourofino em Campo (/ourofinoemcampo/)

Perguntas Frequentes (/perguntas-frequentes/)

Investidores (http://ri.ourofino.com/)

Fornecedores (/fornecedores/)

Contato (/contato/)

Trabalhe conosco (/trabalhe-conosco/)

Atuação internacional (/atuacao-internacional/)

Siga a Ourofino nas redes sociais:

(https://www.facebook.com/ourofinosaudeanimal/) (https://www.instagram.com/ourofinosaudeanimal/) (https://www.youtube.com/channel/UCADok3wRN85sdFVNb0agronegocio)

Links úteis:

App Ourofino (/app/) Boleto (https://www.ourofinosaudeanimal.com/boleto/)

Canal de Denúncias (/canal-denuncia/) Código de conduta (/codigo-de-conduta/)

Identidade visual (/identidade-visual/) Intranet (http://intra.ourofino.com/login-intra/)

Nossa Cultura (https://nossosvalores.ourofinosaudeanimal.com/)

Política de privacidade (/politica-de-privacidade/) Termos de uso (/termos-de-uso/)

Termos de uso do APP (/app/termos-de-uso/) Sustentabilidade (/sustentabilidade/)

elatório de reclamações (/sustentabilidade/ise/) Preferências de Cookie

Privacidade - Termos

(/)

Rodovia Anhanguera SP 330, Km 298
Distrito Industrial - CEP 14140-000
Cravinhos - SP - Brasil
0800 941 2000 (tel:08009412000)

DISQUE-INTOXICAÇÃO ANVISA

Acidentes ou intoxicação com os produtos Ourofino, entre em contato com o Disque-Intoxicação da ANVISA 0800-722-6001 (tel:08007226001).

(https://certificacao.gptw.info/certificated-company/57624462000105)

Estar entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil é resultado do orgulho e satisfação das nossas pessoas.

Privacidade - Termos

Cetamin

Cloridrato de Cetamina 10%

Uso Veterinário

Solução Injetável

AÇÃO:
Agente anestésico para caninos, felinos e equinos.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Cetamina (Cloridrato) .....10,0 g
Veículo estéril q.s.p. .....100,0 mL

INDICAÇÃO:
CETAMIN (Cloridrato de Cetamina) é indicado como agente anestésico único para procedimentos cirúrgicos e diagnósticos que não necessitem de relaxamento da musculatura esquelética. É empregado para pequenos procedimentos, mas pode ser usado em doses adicionais para procedimentos mais prolongados.

FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA:
A Cetamina induz anestesia e amnesia por ruptura funcional do sistema nervoso central mediante estímulo acentuado ou indução de um estado cataléptico. Possui rápido início de ação após a administração intramuscular ou endovenosa, devido sua elevada lipossolubilidade, sobre o sistema nervoso central.
A combinação da depuração rápida e grande volume de distribuição da Cetamina resulta em meia-vida de eliminação de 2 a 3 horas após a dose endovenosa única, embora essa possa ser mais curta, quando estimulada pelo uso de método de infusão contínua, por razões obscuras.
A Cetamina liga-se a proteínas plasmáticas em até 45% a 50%, com maior afinidade pela glicoproteína ácida α do que pela albumina.
Não foram relatados quaisquer efeitos de natureza carcinogênica, teratogênica, mutagênica, hipersensibilidade e sobre a flora normal. Tampouco se observou a resistência aos agentes patógenos e discrasias sanguíneas. O produto não causa dependência física ou psíquica nas doses indicadas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:
CETAMIN deve ser aplicado por via intramuscular ou intravenosa em cães e gatos, e somente intravenosa em equinos.

Para caninos e equinos recomenda-se a associação anestésica, conforme posologia abaixo:

EQUINOS:
40 µg de detomidina/kg + 2,0 mg de cetamina/kg pela via intravenosa.

CÃES:
2,2 mg de xilazina/kg + 11,0 mg de cetamina/kg pela via intramuscular.
1,0 mg de xilazina/kg + 10,0 mg de cetamina/kg pela via intravenosa.

GATOS:
10,0 a 25,0 mg de cetamina/kg pela via intramuscular.
5,0 a 10,0 mg de cetamina/kg pela via intravenosa.

ASSOCIAÇÕES:
Cetamina e Xilazina: tem-se consagrado em caninos e felinos esta associação devido à sua praticidade, pois o próprio cirurgião efetua a anestesia com dose única e por via intramuscular. O uso subcutâneo de atropina 10 a 15 minutos antes da aplicação dos dois fármacos é indispensável, evitando efeitos colaterais.

Cetamina e Detomidina: tem-se observado a sua praticidade, em equinos para se efetuarem pequenas cirurgias com o animal em posição quadrupedal, convém salientar que esta associação não permite intervir na região abdominal ou torácica.

Cetamina e Romifidina: associação válida desde que feita sequencialmente. Primeiramente aplica-se a romifidina pela via endovenosa. Convém ressaltar que a qualidade desta associação é de nível semelhante à associação anterior, entretanto a romifidina isoladamente não possui o mesmo efeito analgésico da detomidina.

PRECAUÇÕES:
Em animais idosos, gestantes, animais sujeitos a episódios epilépticos e hipertensos. Os efeitos extrapiramidais observado com o uso isolado à base de Cetamina são suprimidos pelo emprego de MPA (Medicamento Pré-Anestésico) à base de fenotiazínicos. O Cloridrato de Cetamina deve ser aplicado lentamente por via endovenosa, a fim de se evitar as alterações dos parâmetros fisiológicos de maneira abrupta, fato não observado quando aplicado por via intramuscular.

EFEITOS COLATERAIS:
Em felinos observa-se frequentemente catalepsia seguida por ataxia e aumento da atividade motora. Podem ocorrer convulsões, especialmente em animais epiléticos.

CONTRAINDICAÇÕES:
Cetamina é contraindicada em animais acometidos de disfunção hepática ou renal, em lesões cranianas, animais com reserva cardiopulmonar reduzida, animais epilépticos, presença de pressão intraocular aumentada, de lesão aberta do olho e em animais com quadro tirotóxico.

APRESENTAÇÃO:
1 Frasco-ampola de 10 mL ou de 50 mL, contendo solução injetável de Cloridrato de Cetamina à 10%.

MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

UTILIZAR EM ATÉ 30 DIAS APÓS O PRIMEIRO USO.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° SP 000200-3.000003 em 25/01/2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:
Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim
Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira

V-007

Xilazin®

Cloridrato de Xilazina 2%

Uso Veterinário
Solução Injetável

AÇÃO:

Sedativo, analgésico e miorrelaxante para bovinos, caninos e felinos.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:
Xilazina (Cloridrato).....2 g
Veículo q.s.p.....100 mL

INDICAÇÃO DE USO:
A Xilazina exerce atividades analgésica e sedante, mas caracteriza-se por sua acentuada ação miorrelaxante a nível central, sendo usada em grande escala para a contenção farmacológica em animais.

FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA:
Produz um estado de sonolência, acompanhado de moderada ação analgésica nas diferentes espécies animais. Xilazin® não causa dependência física ou psíquica em doses terapêuticas. Sobre a flora normal pode provocar ocasionalmente uma expulsão de fezes pastosas ou líquidas, nada se observou a resistência aos agentes patógenos e discrasias sanguíneas. Não possui efeitos de natureza carcinogênica, teratogênica ou mutagênica. A meia vida de eliminação da Xilazina é de aproximadamente 40 minutos em caninos e 45 minutos em bovinos. Dependendo da dosagem no bovino, a eliminação é de aproximadamente 36 horas.

APLICAÇÃO E POSOLOGIA:
CANINOS E FELINOS: A via de administração pode ser intramuscular e endovenosa,na dosagem de 1 a 4 mg/kg, para executar suturas, extrações dentárias, limpeza de tártaros, retirada de pontos, coleta de sangue e urina, exames radiológicos, raspados de pele, limpeza de feridas cirúrgicas, limpeza de ouvidos e outras intervenções mais dolorosas. Nesta dosagem, Xilazin® produz sedação que mantém por 1 a 2 horas e analgesia de 15 a 30 minutos.

BOVINOS: A via de administração pode ser intramuscular e endovenosa.
- Dose de até 0,05 mg/kg permite nítida sedação para executar extração de agrantes, facilitar a realização de anestesias locais, rumenotomia, laparotomia, cesariana, redução do prolapso de útero, facilitação de embriotomia, mudanças de pensos e tratamento intramamário.

- Dose de até 0,1 mg/kg permite forte sedação para executar exames na cavidade bucal, abertura de abscessos, suturas superficiais de feridas e desobstrução do canal dos tetos, tratamento de cascos, colocação de argolas nas narinas e lavagens do prepúcio.

- Dose de até 0,2 mg/kg permite sedação muito intensa, analgesia e relaxamento muscular para amputação de chifres e cascos, operação cesariana em decúbito, eliminação das contrações pós-parto, sutura dos tetos, castrações, punções, colocação de gesso e marcação cutânea a ferro. É recomendável jejum de algumas horas a partir desta dosagem.

- Dose de até 0,3 mg/kg permite sedação muito intensa, a ponto do animal não se conservar em pé.

ASSOCIAÇÕES COM OUTROS PRODUTOS:

CANINOS E FELINOS: O Xilazin® pode ser associado com cloridrato de cetamina,como pré-anestésico com barbitúricos e com anestésicos locais para intervenções cirúrgicas mais profundas.

PRECAUÇÕES
Em animais idosos, gestantes, desidratado e com obstrução urinária, a dose deve ser reduzida e só usado quando não houver opção mais segura. O Cloridrato de Xilazina deve ser injetado lentamente para não ocorrer efeitos indesejáveis; para quaisquer emergências.
O efeito sedativo pode ser reduzido por ruídos, intranquilidade, manipulação no animal, etc.

CONTRAINDICAÇÕES:
Xilazin® deve ser cuidadosamente controlado nos animais debilitados, com respiração deprimida, cardiopatia, enfraquecimento renal e hepático, choque ou quaisquer outras condições de estresse. A droga é contraindicada em animais durante o último mês de prenhez (por precipitar um parto precoce ou aborto) e em bovinos desidratados.

ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVINOS:
ABATE - ESTE PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.
LEITE - ESTE PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.

MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

APRESENTAÇÃO:
Frasco-ampola com 10 mL e 50mL contendo solução injetável a 2% de cloridrato de xilazina.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

V-007

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob o nº 7.899 em 14/08/2001.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP 11.427

(11) 4702-5425
sac@syntecvet.com.br
www.syntecvet.com.br

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE :
Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178, Votuparim
Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira

Syntec

Imicarb

USO VETERINÁRIO

PEARSON SAÚDE ANIMAL

Para o tratamento profilático e curativo da babesiose e anaplasmose

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Imidocarb (dipropionato) ..... 12,0 g
Veículo q.s.p. ..... 100,0 mL

Indicações:
Imicarb é recomendado no tratamento profilático e curativo da babesiose causada por *Babesia spp*. em bovinos e eqüinos e da anaplasmose em bovinos causada por *Anaplasma marginale*.
Essas doenças são produzidas por hemoparasitos que por sua vez são transmitidos por carrapatos e insetos, bem como mecanicamente, através de injeções, descorna, castração, etc.
Imicarb também é indicado no controle das reações clínicas provocadas pela inoculação sangüínea de *Babesia* e *Anaplasma* nos processos de premunição.

Posologia e modo de usar:
Em bovinos, por via subcutânea:
No tratamento da babesiose confirmada por exame laboratorial, administrar 1 mL para cada 100 kg de peso corporal, ou seja, 1,2 mg de princípio ativo/kg de peso.
No tratamento da anaplasmose e das infecções mistas (por *Anaplasma* + *Babesia*), administrar 1 mL para cada 40 kg de peso corporal, ou seja, 3,0 mg de princípio ativo/kg de peso.

Na premunição:
Como a babesiose tem período de incubação mais curto, seus sintomas são os primeiros a aparecer.
A dose recomendada para controle da babesiose é de 1 mL para cada 100 kg de peso, ou seja, 1,2 mg de princípio ativo/kg de peso corporal.
Algumas semanas depois poderão aparecer sintomas da anaplasmose. Caso o quadro clínico seja severo, poderá ser usada uma dose 2,5 vezes maior que a recomendada inicialmente para babesiose.

Importante:
Nunca repetir o tratamento antes de transcorridos 7 dias da última administração.

Na quimioprofilaxia:
Imicarb pode ser utilizado nas seguintes situações:
1. Quando são colocados animais suscetíveis em áreas de incidência de babesiose: administrar o produto no momento da transferência ou nos primeiros 5 dias, na dose de 1 mL para cada 100 kg de peso, ou seja, 1,2 mg de princípio ativo/kg de peso corporal.
2. Quando são colocados animais suscetíveis em áreas de incidência de anaplasmose: administrar o produto aos primeiros sinais de sintomatologia clínica da doença, na dose de 1 mL para cada 40 kg de peso corporal, ou seja, 3,0 mg de princípio ativo/kg de peso.
Considerando que o período de incubação da anaplasmose é mais prolongado, não se deve tratar antes do aparecimento da doença, pois isso impedirá o desenvolvimento da imunidade após a infestação pelos carrapatos.
3. Quando da ocorrência de infecções mistas ou de agente causal desconhecido, o esquema proposto no item 1 também poderá ser obedecido. Dessa forma, o animal estará protegido da babesiose, mas talvez não estará protegido contra a anaplasmose. Para isso poderá ser necessário um segundo tratamento a ser feito somente quando forem observados sintomas clínicos da doença.

Observação:
Quando o produto é utilizado nas condições acima descritas, sua administração isoladamente não confere imunidade. Esta dependerá sempre da exposição do animal aos agentes causais *Babesia* e *Anaplasma*.
Considerando ser o carrapato o principal vetor dos agentes causais mencionados, não é recomendado o tratamento carrapaticida nos animais medicados com o produto, de modo a permitir uma alta infestação.

Em equinos, por via intramuscular:
Em casos de babesiose, administrar 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, ou seja, 2,4 mg de princípio ativo/kg de peso. Essa dose, quando usada como profilática, protegerá os animais por cerca de 4 semanas.
Quando o agente causal for *Nuttallia equi*, poderá ser necessária uma segunda dose 24 horas após a primeira.

Contraindicações:
Não tratar vacas produzindo leite para consumo humano.
Não usar em eqüinos quando destinado ao consumo humano.

Precauções:
Animais tratados poderão eventualmente apresentar sintomas colinérgicos leves (salivação, lacrimejamento, cólica passageira) após a administração do produto. Nesses casos recomenda-se aplicação de sulfato de atropina.
Respeitar a dosagem recomendada, sem excedê-la.
Não aplicar a vacina sangüínea contra a anaplasmose e a babesiose no prazo de até 28 dias após a administração do produto, pois haverá interferência na imunidade contra a babesiose.

Interações medicamentosas:
Quando utilizar **Imicarb**, não aplicar simultaneamente inseticidas ou anti-helmínticos organofosforados.

Intoxicação e superdosagem nos animais:
Em casos de intoxicação os sintomas são do tipo colinérgico, ou seja, salivação, lacrimejamento, cólica passageira. Nesses casos recomenda-se aplicação de sulfato de atropina.

Período de carência e restrição de uso:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

EQUINOS: PRODUTO NÃO INDICADO PARA EQUINOS DESTINADOS AO ABATE.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário

Produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos e não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.

Téc. Resp.: Roberta Costa e Sousa Rezende - CRF-SP 88.540

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.205 em 08/04/2002

Apresentação: Frasco contendo15 mL

Conservar em local seco e fresco (entre 2ºC e 25ºC), ao abrigo da luz solar direta.

Sempre que possível, armazenar em refrigerador.

Eurofarma

Fabricante e Proprietário:
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6
Itaqui / Itapevi - SP - CEP: 06696-000
CNPJ: 61.190.096/0008-69 - Indústria Brasileira

218149-03 (D)
(08/18)

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800-709-1999

Flobiotic®

Enrofloxacino 10%

USO VETERINÁRIO

Solução Injetável

Ação:
Agente antibiótico para tratamento das infecções de bovinos e suínos.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Enrofloxacino.....10,0 g
Veículo q.s.p.....100,0 mL

Indicação de uso:
FLOBIOTIC® é indicado no tratamento das infecções causadas por:

Bovinos:
- Enterites (diarreias): *E. coli* e *Salmonella* spp.;
- Pneumonias (infecções respiratórias): *Staphylococcus* spp., *Pasteurella* spp. e *Mycoplasma* spp.;
- Infecções piogênicas secundárias: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. e *Corynebacterium piogenes*;
- Mastite: *Staphylococcus* spp. e *Streptococcus* spp.

Suínos:
- Colibacilose: *E. coli*;
- Salmonelose: *Salmonella* spp.,
- Pleuropneumonia: *Haemophilus* spp.;
- Rinite atrófica: *Corynebacterium pyogenes*
- Síndrome MMA (Mastite-Metrite-Agalactia): *Staphylococcus* spp. e *Streptococcus* spp.

Aplicação e Posologia:
FLOBIOTIC® deve ser aplicado com o auxílio de seringa e agulha por via intramuscular.

Bovinos e suínos: 2,5 mg/kg de peso durante 3 dias, o que equivale a 0,5 mL de **FLOBIOTIC®** para cada 20 kg de peso. Nas infecções respiratórias complicadas aplicar 0,5mL para cada 10 kg de peso durante 5 dias.

Obs: Quando o volume a ser administrado for superior a 10 mL, recomenda-se aplicar em dois locais diferentes.

Contraindicações, Efeitos Colaterais ou Secundários:
Não é recomendada a aplicação em animais jovens, pois as quinolonas, em geral, podem provocar erosão das cartilagens das juntas.

Os efeitos colaterais ou secundários, raramente são graves a ponto de se interromper o tratamento. Os mais frequentes são náuseas e tontura. Pode-se observar distúrbios gastrintestinais incluindo dor abdominal, anorexia, vômito e diarreia.

Interações medicamentosas:
Adminstração simultânea com a ciclosporina está associada com o aumento da creatinina sérica.

Embora de incidência rara, a alcalinização urinária com bicarbonato de sódio, citratos ou inibidores de anidrase carbônica, pode reduzir a solubilidade das fluorquinolonas na urina, causando cristalúria e nefrotoxicidade.

Evitar a associação de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham Fe, Zn, Mn e Ca, pois eles reduzem absorção das quinolonas.

Não associar com sulfas e trimetoprim.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERIODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS:
"ABATE:O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO."
"LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO."
SUÍNOS
"ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 9 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO"

A UTILIZAÇÃO OU PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Modo de Conservação:
Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

Apresentação:
Frasco-ampola contendo 10, 50 ou 500 mL acondicionado em cartucho individual.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
PROIBIDO PARA USO HUMANO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.785 em 05/03/99

Responsável Técnico:
Dra Vera de Fátima Costa Calixto
CRF/SP nº 11.427

Proprietário e Fabricante:
Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim
Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira

V-007

Flobiotic®

Enrofloxacina Comprimidos
Uso Oral
Uso Veterinário

Composição:

Cada comprimido contém:	**50 mg**	**150 mg**	**250 mg**
Enrofloxacina (base)	50 mg	150mg	250mg
Veículo q. s. p.	120 mg	360 mg	600 mg

MECANISMO DE AÇÃO:
Flobiotic® comprimidos é um produto composto por enrofloxacina, um antimicrobiano bactericida, do grupo das quinolonas de segunda geração. A sua atividade antimicrobiana está relacionada com a inibição da DNA Girase.

INDICAÇÕES:
Flobiotic® comprimidos é um antibiótico de uso oral a base de enrofloxacina, antimicrobiano pertencente ao grupo das fluorquinolonas. É indicado no tratamento de infecções causadas por *Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Salmonella choleraesuis, Campylobacter jejuni, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp, Chlamydia spp, Streptococcus pyogenes, Pasteurella multocida e Enterococcus sp,* tais como, infecções geniturinárias, respiratórias e entéricas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:
Administrar **Flobiotic® comprimidos** via oral.
A dose recomendada para cães e gatos é 5mg/kg, cada 24 horas, durante 10 dias, ou a critério do Médico Veterinário, ou seja:

1 comprimido de 50 mg para cada 10 kg de peso vivo
1 comprimido de 150 mg para cada 30 kg de peso vivo
1 comprimido de 250 mg para cada 50 kg de peso vivo

O tratamento deve ser prolongado por período não inferior a 48 hora após o desaparecimento dos sintomas.

PRECAUÇÕES:
A administração conjunto a cátions di ou trivalentes, como produtos que contenham alumínio (ex: sucralfato), ferro ou cálcio, podem diminuir sua absorção.
Em gatos, não exceder a dose de 5 mg / kg / dia, altas doses podem ocasionar cegueira parcial ou completa e midríase temporária ou permanente.

CONTRAINDICAÇÕES:
Evitar o uso em animais jovens (cães: idade inferior a 8 meses porte médio ou inferior a 12 meses porte grande; e gatos: com idade inferior a 8 semanas) devido ao risco de lesão em cartilagem e em fêmeas prenhes.

MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

APRESENTAÇÃO:
Cartucho contendo 10 comprimidos de 120 mg, com 50 mg de Enrofloxacina base;
Cartucho contendo 10 comprimidos de 360 mg, com 150 mg de Enrofloxacina base;
Cartucho contendo 10 comprimidos de 600 mg, com 250 mg de Enrofloxacina base.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.084 em 03/06/2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dra. Vera de Fátima Costa Calixto
CRF/SP nº 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:
Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim
Santana de Parnaíba/SP
CEP: 06513-010
CPNJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira

V-003

SELVITREX INJETÁVEL 2,5%

Compartilhar no facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://jofadel.com.br/novo/produtos/selvitrex-injetavel/)

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Enrofloxacino	2,5 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

INDICAÇÕES: Indicado nas infecções de cães e gatos, causadas por bactérias Gram positivas e Gram negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacino.

– Nas infecções de cães e gatos, tais como:

Infecções dérmicas (piodermites): *Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermitis, Escherichia coli, Pseudomonas spp. e Proteus mirabilis*. Infecções respiratórias (pneumonias) causadas por: *Pasteurella spp., Escherichia coli, Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., Haemophilus spp. e Mycoplasma spp*. Infecções entéricas (diarreias) primárias e secundárias causadas por: *Escherichia coli, Campylobacter spp., Treponema hyodysenteriae e Salmonella spp*. Infecções do ouvido (otites) causadas por: *Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., Proteus spp*. e *Streptococcus spp*. Infecções genitourinárias (nefrite, cistite e pielonefrite) causadas por: *Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Enterobacter spp., Mycoplasma spp., Klebsiella spp. e Brucella spp.* É também indicado no tratamento de infecções pós-operatórias decorrentes de castrações, laparotomias e lesões acidentais.

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO: Solução pronta para uso por vias intramuscular, subcutânea e intravenosa.

DOSAGEM: CÃES E GATOS: 1 mL para cada 5 kg de peso corporal. Duração do tratamento: 3 a 5 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário.

ATENÇÃO: Doses acima de 10 mL devem ser divididas em dois ou mais pontos de injeção.

Recomendamos que o tratamento seja prolongado por um período mínimo de 48 horas após o desaparecimento dos sintomas ou a critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES:

– Observar as normas de assepsia para administração de injetáveis.

– Em testes clínicos não foram observadas quaisquer alterações nas articulações e, nem tão pouco, em outras partes do aparelho locomotor. Porém, há literaturas que contra indicam a utilização de substâncias do grupo das quinolonas em cães de raças pequenas e médias durante a fase de crescimento rápido (2 a 8 meses de idade). Em cães de grande porte este período pode chegar a 10 meses. Não se aconselha também o uso em gatos com menos de 2 meses de idade.

– Injeções por via subcutânea em cães podem provocar, eventualmente, reações locais. Recomendamos a aplicação de compressas quentes no local da injeção.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças.

APRESENTAÇÃO: Frascos-ampola com 10, 20, 50 e 100 mL.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO.

Outros produtos

Animais de produção (http://jofadel.com.br/novo/categorias/animais-de-producao/)

Ver produtos » (http://jofadel.com.br/novo/categorias/animais-de-producao/)

Animais de companhia (http://jofadel.com.br/novo/categorias/animais-de-companhia/)

Ver produtos » (http://jofadel.com.br/novo/categorias/animais-de-companhia/)

FLUMEDIN

FLUMEDIN

Compartilhar no facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://jofadel.com.br/novo/produtos/flumedin/)

USO VETERINÁRIO

ANALGÉSICO, ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIPIRÉTICO INJETÁVEL.

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Flunixino meglumina	8,29 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

FLUMEDIN: Pertence ao grupo de anti-inflamatórios não esteroides com ação antiprostaglandínica e, dentro deste grupo, em função de sua estrutura química, se classifica dentro dos derivados do ácido fenâmico. Sua ampla e efetiva atividade farmacológica se explica em função dos seguintes mecanismos: inibição da cicloxigenase, desacoplamento da fosforilação oxidativa, inibição da migração leucocitária, inibição da degradação dos proteoglicanos, capacitação de radicais livres, inibição da potenciação das quininas, diminuição da atividade de necrose tumoral ou caquética (FNT) e estabilização das membranas celulares mediada pelo AMP cíclico.

INDICAÇÕES: FLUMEDIN está indicado para os casos em que se busca um efeito analgésico, anti-inflamatório e antipirético, rápido e potente, com uma ampla margem de segurança.

– BOVINOS: doença respiratória aguda, mastites coliformes agudas (choque endotóxico), outros processos febris, dor (síndrome da vaca inchada), diarreias dos bezerros e transtornos músculo-esqueléticos.

– SUÍNOS: M.M.A. (mastites, metrites, agalactia), manqueira e artrites (inflamações do aparelho locomotor em geral).

– EQUINOS: Transtornos músculo-esqueléticos, cólicas, diarreias dos potros (não infecciosa e infecções neo-natais), choque, colites, laminites e enfermidades respiratórias.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

EQUINOS: ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

SUÍNOS: ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, POSOLOGIA E MODO DE USAR:

BOVINOS: nas alterações músculo-esqueléticas: 1,1 mL para cada 50 kg de peso, por via intravenosa ou intramuscular, 1 a 2 vezes ao dia (intervalo de 12 horas entre as doses). Nas demais indicações: 2 mL para cada 45 kg de peso, por via intravenosa, 1 a 2 vezes ao dia (intervalo de 12 horas entre as doses). Diarreia dos bezerros: 2 a 3 mL por bezerro, geralmente uma única aplicação.

SUÍNOS: manqueiras e artrites (inflamações do aparelho locomotor em geral): 2 mL para cada 45 kg de peso, por via intramuscular profunda, 1 vez ao dia, durante 5 dias.

M.M.A. (mastites, metrites, agalactia): 2 mL para cada 45 kg de peso, por via intramuscular profunda, 1 a 2 doses (intervalo de 12 horas entre as doses). Recomenda-se administrar as doses cedo, ao aparecerem na porca os primeiros sintomas de inapetência ou se os leitões derem a impressão de não estar recebendo leite suficiente.

Demais indicações: 2 mL para cada 45 kg de peso, por via intramuscular profunda, 1 a 2 vezes ao dia (intervalo de 12 horas entre as doses).

EQUINOS: colites e pneumonia: 2 mL para cada 45 kg de peso, por via intravenosa ou intramuscular, 1 a 2 vezes ao dia (intervalo de 12 horas entre as doses). Diarreias infecciosas e não infecciosas: 2 mL para cada 45 kg de peso, por via intravenosa, 2 a 4 vezes ao dia (intervalo de 12 ou 6 horas entre as doses). Transtornos músculo-esqueléticos: 1 mL para cada 45 kg de peso, por via intravenosa ou intramuscular, 1 vez ao dia, durante 5 dias.

CÓLICAS: 1 mL para cada 45 kg de peso, por via endovenosa, por sua pronta ação, o que ocorre em 15 minutos ou menos. Se com 2 doses não houver melhora pode-se indicar outras medidas, a critério do Médico Veterinário.

CHOQUE: 1 mL para cada 45 kg de peso, até que cesse o choque.

LAMINITES: como curativo: 1 mL para cada 45 kg de peso, por via intravenosa, 1 vez ao dia, durante 3 dias. Como preventivo: 0,5 mL para cada 45 kg de peso, por via intravenosa, 4 vezes ao dia (intervalo de 6 horas entre as doses), durante 3 dias. Nos casos de cólicas ou infecções, deve-se determinar a causa e estabelecer um tratamento concomitante adequado (antibióticos, corticosteroides, antidiarreicos, fluidos, enemas, etc.).

SOBREDOSIFICAÇÃO: Não exceder as doses recomendadas, nem administrar o tratamento durante mais de 5 dias consecutivos.

EFEITOS COLATERAIS E REAÇÕES ADVERSAS: Deve-se evitar a injeção intrarterial em cavalos, já que podem apresentar efeitos secundários (ataxia, incoordenação, hiperventilação, histeria e debilidade muscular). As reações adversas são transitórias e desaparecem, sem necessidade de tratamento, em poucos minutos. Não usar em casos de hipersensibilidade em equinos. Reações alérgicas, gastrites, ulcerações e lesões da mucosa gástrica, em equinos, podem ocorrer. Não apresenta nenhum efeito colateral secundário. Pode apresentar efeito colateral secundário, quando se aplica inadvertidamente em cavalos, como citado anteriormente. Tem-se discreta reação local, após injeção intramuscular nestes casos, principalmente na região do colo, incluindo inflamação, endurecimento e rigidez.

PRECAUÇÕES: Administrar sob controle veterinário. Não exceder as doses recomendadas. Não administrar o tratamento por mais de 5 dias consecutivos. Não administrar em cavalos de corrida nos 8 dias anteriores à competição. Não administrar em fêmeas prenhes ou em lactação. Não utilizar em caso de hipersensibilidade

CONTRAINDICAÇÕES: Não apresenta para as espécies as quais se destina. Não administrar em gatos.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS: Não se deve administrar FLUMEDIN com outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Também deve-se evitar a associação com medicamentos que apresentam toxicidade renal.

Não existem estudos que estabeleçam segurança quando do uso de FLUMEDIN com outros medicamentos. Por esta razão deve-se monitorar e controlar os animais quando se administra este medicamento juntamente com outros princípios ativos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças.

APRESENTAÇÃO: Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 10, 30, 50 ou 100 mL. Cartucho coletivo contendo 10 frascos-ampola com 10 mL.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO.

BRAVECTO™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (/produto/cães-e-gatos/bravecto/1)
CARACTERÍSTICAS (/produto/cães-e-gatos/bravecto/2)
RESUMO DA BULA (/produto/cães-e-gatos/bravecto/3)

É indicado para o tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Saiba mais em www.bravecto.com.br (http://www.bravecto.com.br)

FÓRMULA:

Cada 1 g do produto contém:

Fluralaner .....136,4 mg
Excipientes q.s.p. .....1,0 g

INDICAÇÕES:

Para o tratamento de infestações por carrapatos e pulgas, em cães, proporcionando 12 semanas de proteção. Esse produto veterinário é um inseticida e acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eficácia imediata e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de *Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes scapularis, Ixodes holocyclus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis* e *Rhipicephalus sanguineus*) e pulgas (*Ctenocephalides felis* e *Ctenocephalides canis*).
Pulgas e carrapatos devem estar aderidos ao cão e iniciar a alimentação para serem expostos ao princípio ativo. O início da ação é dentro de 8 horas para pulgas e 12 horas para carrapatos.
O produto controla eficazmente as populações de pulgas no ambiente, nas áreas às quais o cão tem acesso.
O produto pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento para a dermatite alérgica à picada de pulgas.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSAGEM E MODO DE USAR:

Comprimido mastigável para administração oral.
Dosagem:
BRAVECTO™ comprimidos mastigáveis deve ser administrado de acordo com a tabela a seguir (equivalente a 25-56 mg fluralaner/kg peso corporal dentro de cada faixa de peso).

Peso (kg) dos cães	Número e apresentação do comprimido a ser administrado				
	Bravecto 112,5 mg	Bravecto 250 mg	Bravecto 500 mg	Bravecto 1000 mg	Bravecto 1400 mg
2 – 4,5	1				
>4,5 - 10		1			
>10 - 20			1		
>20 -40				1	
>40 - 56					1

Para cães com mais de 56 kg, utilizar uma combinação de dois comprimidos que mais se aproxime do peso corporal.
Modo de usar:
Os comprimidos não devem ser quebrados ou divididos.
Administrar BRAVECTO™ comprimidos mastigáveis no ou por volta do horário de alimentação.
BRAVECTO™ é um comprimido mastigável que é bem aceito pela maioria dos cães. Se um comprimido não for ingerido voluntariamente pelo cão pode ser fornecido na alimentação ou diretamente na boca. O cão deve ser observado durante a administração para confirmar que o comprimido foi ingerido.
Esquema de tratamento:
Para o controle ideal de infestações por pulgas e carrapatos, o produto deve ser administrado em intervalos de 12 semanas.
BRAVECTO™ comprimidos mastigáveis deve ser administrado 4 vezes num intervalo de 1 ano (12 meses) para garantir máxima proteção ao cão.

PRECAUÇÕES:

- Manter o produto na embalagem original até sua utilização, a fim de evitar que crianças tenham acesso direto ao produto.
- Não comer, beber ou fumar enquanto manusear o produto.
- Lavar bem as mãos com água e sabão imediatamente após o uso do produto.
- Restos do produto ou embalagens vazias devem ser descartados de forma adequada, de acordo com as exigências locais.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Não utilizar em caso conhecido de hipersensibilidade aos componentes do produto.
- A segurança do produto não foi estabelecida em cães com menos de 8 semanas de idade ou com peso inferior a 2 Kg.
- O produto não deve ser administrado em intervalos com menos de 8 semanas já que a segurança para intervalos mais curtos não foi testada.
- O tratamento reduz o risco de transmissão de doenças causadas por carrapatos e pulgas devido ao rápido início da ação acaricida e inseticida. Os parasitos precisam iniciar a alimentação no cão para serem expostos ao fluralaner, portanto o risco de transmissão de doenças causadas por carrapatos e pulgas não pode ser excluída em condições desfavoráveis.
- Fluralaner se liga às proteínas plasmáticas e pode competir com outros fármacos ligantes como anti-inflamatórios não esteroidais e o derivado de cumarina warfarin. Incubação de fluralaner na presença de carprofeno e warfarin no plasma de cães em concentrações máximas não reduziu a ligação às proteínas do fluralaner, carprofeno ou warfarin. Nos estudos clínicos, nenhuma interação entre o BRAVECTO™ comprimidos mastigáveis e produtos veterinários usados na rotina foram observados.

EFEITOS COLATERIAIS:

Casos raros (1,6%) de reações gastrointestinais leves ou transitórias como diarreia, vômito, inapetência, salivação relacionados à administração do produto foram observados nos estudos clínicos.

APRESENTAÇÕES:

Cartuchos contendo 1, 2 ou 4 comprimidos mastigáveis de 112,5 mg (cães entre 2 e 4,5 Kg); 250 mg (cães entre 4,5 e 10 Kg); 500 mg (cães entre 10 e 20 Kg); 1000 mg (cães entre 20 e 40 Kg) ou 1400 mg (cães entre 40 e 56 Kg).

VENDA E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.
Conservar o produto em sua embalagem original, em local fresco e seco, à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

MELLIS® VET

MELOXICAM

USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório não esteroidal de uso oral para cães

Fórmula

Cada comprimido de Mellis® Vet 0,5 mg contém:
Meloxicam _____ 0,5 mg
Excipientes q.s.p. _____ 70 mg
Cada comprimido de Mellis® Vet 2,0 mg contém:
Meloxicam _____ 2,0 mg
Excipientes q.s.p. _____ 280 mg
Cada comprimido de Mellis® Vet 3,0 mg contém:
Meloxicam _____ 3,0 mg
Excipientes q.s.p. _____ 420 mg
Cada comprimido de Mellis® Vet 4,0 mg contém:
Meloxicam _____ 4,0 mg
Excipientes q.s.p. _____ 560 mg

Informações técnicas

O meloxicam é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), inibidor preferencial da enzima cicloxigenase do tipo 2 (COX2), pertencente à classe dos oxicans, que inibe a produção de prostaglandinas envolvidas no processo inflamatório. O fármaco apresenta ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Meloxicam é rapidamente absorvido por via oral, atinge pico plasmático adequado em até 7 horas e pode ser administrado junto com o alimento uma vez ao dia. É eliminado de forma inativa nas fezes, na urina e na bile.

Indicações

Mellis® Vet é indicado como analgésico e anti-inflamatório para cães.

A EFICÁCIA DESTE PRODUTO NÃO FOI AVALIADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).

Posologia e modo de usar

Mellis® Vet deve ser administrado exclusivamente pela via oral. A dose recomendada é de 0,2 mg/kg na primeira dose , seguido de 0,1 mg/kg a cada 24 horas por até 13 dias de acordo com a tabela abaixo.

Peso do animal em kg	Primeiro dia 0,2 mg/kg 1 vez ao dia	Segundo e demais dias 0,1 mg/kg 1 vez ao dia
5 kg	2 comprimidos de 0,5 mg	1 comprimido de 0,5 mg
10 kg	1 comprimido de 2,0 mg	1/2 comprimido de 2,0 mg
15 kg	1 comprimido de 3,0 mg	1/2 comprimido de 3,0 mg
20 kg	1 comprimido de 4,0 mg	1/2 comprimido de 4,0 mg
30 kg	2 comprimidos de 3,0 mg	1 comprimido de 3,0 mg
40 kg	2 comprimidos de 4,0 mg	1 comprimido de 4,0 mg

De acordo com o estudo de eficácia realizado com cães, o produto Mellis® Vet foi considerado 100% eficaz para o controle da dor aguda e da inflamação, quando utilizado a cada 24 horas por 7 dias, sendo a dose inicial de 0,2 mg/kg (dia 1), seguido pela dose de 0,1 mg/kg nos dias subsequentes, em cadelas submetidas a ovariossalpingo-histerectomia (OSH). O tratamento poderá ser prolongado até o 13º dia, de acordo com os resultados obtidos pelo estudo de segurança realizado com o produto.

ME247325 - 240 x 150 mm - PHC 3557

Contraindicações

O produto não deve ser administrado a cães com hipersensibilidade ao meloxicam ou a qualquer componente da fórmula. Não é recomendado para fêmeas prenhes, lactantes nem a cães com menos de 12 meses de idade, pois ainda não foram realizados estudos com esses grupos. Mellis® Vet, assim como todos os anti-inflamatórios não esteroidais, não é recomendado para cães portadores de distúrbios hemorrágicos, doenças cardiovasculares, hepáticas, renais e gastrointestinais, nem a animais desidratados, hipovolêmicos e hipotensos.

Interações medicamentosas

Recomenda-se evitar o uso concomitante de Mellis® Vet com anticoagulantes, outros anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs) e fármacos potencialmente nefrotóxicos, devido ao risco de aumento da incidência de efeitos adversos.

Efeitos adversos

Diante do estudo de segurança realizado com cães, o produto Mellis® Vet demonstrou-se seguro, quando ministrado nas doses recomendadas, por até 13 dias consecutivos. Durante esse período, não foram observadas alterações em exames hematológicos e bioquímicos. Reações como êmese, dor abdominal de leve a moderada, hiporexia e fezes com sangue podem ser observadas, porém com baixa incidência quando o fármaco é administrado conforme as recomendações da bula. Quando utilizado em sobredose e por período superior ao indicado, poderá causar apatia, dor abdominal de leve a intensa, êmese, alteração da consistência das fezes, hiporexia e melena.

Precauções

A segurança de Mellis® Vet não foi testada em cadelas gestantes ou lactantes, cães usados para procriação nem em cães com idade abaixo de 1 ano.

Intoxicação e superdosagem

Em casos de intoxicação ou superdosagem, procurar um Médico Veterinário para avaliação e tratamento suporte. Reações como apatia, dor abdominal de leve a intensa, êmese, alteração da consistência das fezes, hiporexia e melena foram observadas em cães que receberam duas vezes a dose máxima terapêutica recomendada.

Advertências

Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal. Não foram realizados estudos de segurança com cães abaixo de 1 ano de idade, fêmeas prenhes e lactantes.

Apresentação

Blíster contendo 10 comprimidos bissulcados.

Blíster contendo 4 comprimidos bissulcados (AMOSTRA GRÁTIS).

Cuidados de conservação

Conservar o produto em local seco, sob temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em casos de ingestão acidental, procurar um médico e levar a embalagem do produto.

Partida, data de fabricação e de vencimento: vide embalagem.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Produto licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 21/2020 em 29/01/2020.

Proprietário e fabricante
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039 Bragança Paulista - SP
CEP: 12929-600 - CNPJ: 49.475.833/0018-46 - SAC: 0800 941 5566

Responsável técnica: Daniela Ziolkowski, CRF-SP 29.486.

Vencimento: 24 meses após a data de fabricação.

AVERT SAÚDE ANIMAL

Meloxifarm

Meloxicam

1mg, 2mg e 6mg.

Uso Veterinário

Anti-inflamatório, antipirético e analgésico para cães

Meloxifarm é um produto à base de meloxicam, fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) pertence ao grupo dos ácidos enólicos. Meloxicam inibe a síntese de prostaglandina E2 inibindo os efeitos constitutivos da ciclo-oxigenase. Possui propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas. Em comparação com vários outros AINEs testados, o meloxicam demonstrou ser o inibidor mais seletivo da ciclo-oxigenase induzível. É considerado COX-2 preferencial (mas não COX-2 específico).

Fórmula

Cada comprimido de 125 mg contém:
Meloxicam ..... 1 mg
Excipiente q.s.p. ..... 125 mg

Cada comprimido de 250 mg contém:
Meloxicam ..... 2 mg
Excipiente q.s.p. ..... 250 mg

Cada comprimido de 750 mg contém:
Meloxicam ..... 6 mg
Excipiente q.s.p. ..... 750 mg

Indicações

Indicado como Anti-inflamatório, antipirético e analgésico para cães. Empregado para o tratamento agudo e crônico da dor e da inflamação. Indicado nos casos de osteoartrite e também no alivio da dor relacionada a cirurgias.

Posologia e modo de usar

Meloxifarm deve ser administrado diretamente na boca do animal. Caso seja necessário, pode-se usar pequena porção de alimento para auxílio na ingestão do comprimido.
A dose terapêutica do meloxicam com anti-inflamatório é de 0,2 mg/kg de peso vivo inicialmente e de 0,1 mg/kg nas doses de manutenção, administrado em 1 vez ao dia, com intervalo de 5 a 7 dias. Podendo o tratamento ser estendido por até 28 dias nos casos crônicos.

Dosagem

- 1 comprimido de 1 mg para cada 5 kg de peso vivo no primeiro dia de tratamento e ½ comprimido de 1 mg para cada 5 kg de peso vivo nos próximos dias
- 1 comprimido de 2 mg para cada 10 kg de peso vivo no primeiro dia de tratamento e ½ comprimido de 2 mg para cada 10 kg de peso vivo nos próximos dias
- 1 comprimido de 6 mg para cada 30 kg de peso vivo no primeiro dia de tratamento e ½ comprimido de 6 mg para cada 30 kg de peso vivo nos próximos dias

A dosagem, duração e intervalo do tratamento poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

Contraindicações

- Animais que apresentem hipersensibilidade ao meloxicam
- Não deve ser usado em animais com ulceração gastrointestinal ativa ou sangramento.
- Deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos.
- Usar com cuidado em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, pois há um potencial risco aumentado de desenvolvimento de toxicidade renal.
- Não utilizar em animais com menos de 12 meses
- Não utilizar em fêmeas gestantes ou lactantes.

Digitalizado com CamScanner

Interações medicamentosas
- Anticoagulantes (por exemplo, heparina, varfarina, etc.): aumentam a chance de sangramento
- Aspirina e outros aines: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia)
- Corticosteroides: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia)
- Drogas nefrotóxicas (por exemplo, furosemida, aminoglicosídeos, anfotericina b, etc.): pode aumentar o risco de nefrotoxicidade

Precauções
- Ler a bula atentamente
- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto
- Manter a embalagem fechada
- Não reutilizar as embalagens vazias
- Conservar em local fresco e seco, na embalagem original fechada, à temperatura ambiente (15 a 30°C), ao abrigo da luz solar. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos
- Não guardar o produto junto com alimentos, bebidas, outros medicamento, produtos de higiene e domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Reações adversas
Durante o estudo para determinação da segurança clínica em cães, não foram observadas reações adversas. Podem ser evidenciados desconforto gastrointestinal, vômitos, fezes moles, diarreia e inapetência. Estas reações são transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou final do tratamento. Caso o animal apresente qualquer reação adversa, suspenda o uso e procure um médico veterinário.

Conservar em local fresco e seco, na embalagem original fechada, à temperatura ambiente (15 a 30 °C), ao abrigo da luz solar. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos

Não guardar o produto junto com alimentos, bebidas, outros medicamento, produtos de higiene e domésticos.

Validade
24 meses após a data da fabricação

Apresentações
- Cartuchos contendo 1 blister (PVC/ALU) de 10 comprimidos de 1, 2 e 6 mg
- Displays (embalagem coletiva) contendo 6 blisteres (PVC/ALU) de 10 comprimidos de 1, 2 e 6 mg

Responsável técnico: Dra Debora Cristina Lopes Barbosa - CRF/SP 95.249

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o número 259/2019, em 29/11/2022.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Proprietário: MAISA FARINHA DAUD LTDA
CNPJ 43.754.709/0001-95
Rua Camilo de Moraes, n.º 760 - Centro - CEP 15115-000 - Bady Bassitt - SP
site: vetfarmos.com.br – vetfarmos@vetfarmos.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fabricante:
Vetecia Laboratórios de Produtos Veterinários LTDA.
Jacarei/SP – CNPJ: 07.685.131/0001-07

VET FARMOS
SAC
(17)3258.3608
vetfarmos.com.br

Digitalizado com CamScanner

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Flamavet
Meloxicam 0,2 %

USO VETERINÁRIO

ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL PARA CÃES E GATOS

Fórmula:
Cada 1,0 mL contém:
Meloxicam ..... 2,0 mg
Veículo q.s.p ..... 1,0 mL

Informações técnicas:
Meloxicam é classificado como um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), que possui atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. Os AINEs podem ter sua maior ou menor segurança, de acordo com o grau de seletividade perante as ciclo-oxigenase (COX), enzimas que participam da síntese de prostaglandinas. As COX podem ser classificadas de maneira simplificada como COX-1, que é expressa constitutivamente na maioria dos tecidos e está associada a eventos fisiológicos como a integridade da mucosa gástrica, fluxo sanguíneo renal e na coagulação sanguínea, e COX-2, que é uma enzima de ação induzida relacionada aos eventos da resposta inflamatória. Como o meloxicam apresenta atividade seletiva para COX-2, isto confere uma segurança maior em relação aos efeitos adversos.

Indicações:
Flamavet 0,2% é indicado como anti-inflamatório e analgésico para cães e gatos.

Posologia e modo de usar:
Administrar **Flamavet 0,2%** uma vez ao dia, de acordo com a tabela abaixo:

Espécie	1º dia de tratamento	2º dia e tratamentos subsequentes	Via de Administração
Cães	0,2 mg/kg	0,1 mg/kg	IV ou SC
Gatos	0,1 mg/kg	0,05 mg/kg	SC

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. De acordo com os estudos de segurança realizados, a duração do tratamento poderá ser extrapolada por até 7 dias em cães adultos e até 4 dias em gatos adultos, ou a critério do Médico Veterinário.

Contraindicações:
Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.
Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
Não administrar o produto em animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa.
Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.
Não utilizar em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, já que nesses quadros haverá um risco maior de toxidade renal.

Interações medicamentosas:
Não administrar o **Flamavet 0,2%** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos. Não utilizar com

as medicações: digoxina, fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

Efeitos adversos:
Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, vômitos, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.
Como outros anti-inflamatórios não esteroidais inibidores de COX-2, meloxicam pode apresentar efeitos na função plaquetária.
Em casos de anafilaxia, interromper o uso do medicamento imediatamente.

Precauções:
- Uso exclusivo em cães e gatos, na posologia indicada em bula.
- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo.
- Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.
- Manter o produto em sua embalagem original.
- Manter o produto livre de contaminações externas.
- Até o momento, não foram realizados estudos em animais jovens, fêmeas prenhes ou lactantes.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.

Superdosagem:
No caso de superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

Apresentação:
Frasco de vidro incolor de 20 mL

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em até 30 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o nº 30/2018 em 05/02/2018.

Responsável Técnico:
Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Proprietário e Fabricante:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000
DDG 0800 701 1799
CNPJ 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

4020574 - 100X150 mm - Laetus 251

Maxicam 2%

Uso Veterinário

Anti-inflamatório não-esteroide. Ação anti-inflamatória mais potente e duradoura, sem complicações gástricas.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Meloxicam ..... 2,0 g
Excipiente q.s.p. ..... 100,0 mL

Indicações:

Maxicam 2% é um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (cox-2), que confere um duplo benefício terapêutico, resultando em excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos de inflamação degenerativa do aparelho locomotor.
Maxicam 2% é indicado em processos inflamatórios dos bovinos, suínos e equinos; tais como:
- Patologias do aparelho locomotor e doenças músculo-esqueléticas, como: miosites, tendinites, osteítes, artrites, artrites reumatoides, osteoartrites, osteoartrose, sinovites, distensões miotendinosas, traumatismos, claudicações, síndrome do navicular, laminites e auxiliar na reparação de fraturas.
- Afecções oculares: uveítes, conjuntivites, pós-operatório.
- Desordens de ordem reprodutiva como retenção de placenta.
- Metrites e mastites.
- Analgesia pré e pós-operatória.
- Auxiliar no tratamento de infecções bacterianas ou crônicas (pneumonias e diarreias) e quadros febris.

Modo de uso e dosagens:

Maxicam 2% deve ser administrado pela via intramuscular ou intravenosa, uma vez ao dia (a cada 24 horas), ou de acordo com a orientação do médico-veterinário.

Dosagem para bovinos	**2,5 mL para cada 100 kg de peso corporal** (0,5 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Dosagem para suínos	**2,0 mL para cada 100 kg de peso corporal** (0,4 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Dosagem para equinos	**3,0 mL para cada 100 kg de peso corporal** (0,6 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

Duração do tratamento:

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a espécie animal, gravidade do quadro e tipo de afecção a ser tratada.
Recomenda-se até duas aplicações consecutivas, com intervalo de 24 horas, ou a critério do médico-veterinário.

Interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou não esteroides, ou após o uso destas drogas. Recomenda-se um período de 24 horas de intervalo entre um tratamento e outro, ou de acordo com a farmacocinética da droga anteriormente utilizada.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos (Estreptomicina, Neomicina, Gentamicina e Kanamicina).
Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina e a aspirina.

Contraindicações e limitações de uso:
Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.
Não administrar em animais com possível ulceração gastrintestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.
Evitar a administração em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos em razão do risco de toxicidade renal ser potencializado.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 08 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

EQUÍDEOS (*Equus caballus*/ CAVALOS) E SUÍNOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 08 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções:
Obedecer às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto utilizando normas de assepsia próprias para aplicação parenteral.

O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada.

Reações adversas:
Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Informações para uso médico:
O Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide da família dos oxicans e não possui antídoto específico.
No caso de intoxicações, realizar tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.193 em 05/01/06.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira



50003225/ 0918 OF00

ourofino
saúde animal



Microchip para animais Agulhado em Blister Pack

Microchip para animais Agulhado em Blister Pack

Microchip ISSO FDX-B, 134,2 Khz, com camada anti-migratória (Parylene C), medindo aproximadamente 12mmx 2mm encapsulado em BioVidro com vareta de isolação e agulha descartável. Bizel trifacetado, **esterilizado** por EO gás. Embalagem individual.

A aplicação do microchip é extremadamente simples e pode ser comparada com uma vacina, que não protege contra doenças.

O microchip esterilizado possui **memória adicional** que, além do número de identificação do animal, guarda:

o ano da jornada de vacinação de raiva,
o ano da jornada de vacinação de leishmaniose,
o ano da jornada de vacina espécie especifica
a informação se o animal foi castrado ou não.

As informações guardadas na memória podem ser consultadas e/ou alteradas com o microchip implantado no animal. Acompanhado de 6 etiquetas de código de barras.

A aplicação do Microchip para animais Agulhado em Blister Pack se caracteriza por ser extremamente simples, podendo ser comparada a uma vacina que não protege contra doenças.

Uma vez esterilizado, este dispositivo veterinário também se destaca por possuir uma memória adicional que, além do número de identificação do animal em si, serve para guardar as seguintes informações:

- Ano da jornada de vacinação de raiva;
- Dado de confirmação de castração ou não-castração do animal;
- Ano da jornada de vacina espécie-específica;
- Ano de jornada de vacinação de leishmaniose.

Ao se acompanhar de seis etiquetas de códigos de barras, este microchip também permite que os dados arquivados em sua memória sejam consultados ou alterados assim que sua implementação se dá de maneira direta no animal em voga.

Como complemento, pode-se dizer que o Microchip para animais Agulhado em Blister Pack ainda conta com uma cama anti-migratória (Parylene C), mede aproximadamente 12x2 milímetros e se faz protagonista por ser encapsulado em Bio-Vidro com vareta de isolação e agulha descartável.

Por último, mas não menos importante por conta disso, ressalta-se que este aparato veterinário ainda é embalado de forma individual, fazendo valer seu bizel trifacetado e sua esterilização por EO gás.

Invicto®

USO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÃO: Cada comprimido de 100 mg contém:
Nitempiram ----------11,4 mg
Excipiente q.s.p. ---------- 100,0 mg
Cada comprimido de 500 mg contém:
Nitempiram ---------- 57 mg
Excipiente q.s.p. ---------- 500,0 mg

INDICAÇÃO: Indicado para o controle de infestações de pulgas em cães e gatos.

FARMACODINÂMICA: O nitempiram pertence à classe química dos neonicotinóides, atua bloqueando os receptores nicotínicos da acetilcolina, porém não interfere na acetilcolisnesterase, desta forma, resultando na paralisia e morte das pulgas adultas. Em estudo, observou-se uma eficácia superior a 90% em cães e gatos.

FARMACOCINÉTICA: O nitempiram é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal de cães e gatos, com nível de absorção acima de 90%. As concentrações sanguíneas máximas são alcançadas entre 15 minutos e 1 hora após sua ingestão. Mais de 90% do princípio ativo é eliminado pela urina, dentro de 24 horas em cães e 72 horas em gatos.

POSOLOGIA: O produto deve ser administrado por via oral na dose terapêutica de 1 mg/kg de peso corporal, ou de acordo com a seguinte recomendação:

ESPÉCIE/PESO	DOSAGEM
Cães e gatos com até 11,4 kg	01 (um) comprimido de 11,4 mg
Cães acima de 11,4 kg até 57 kg	01 (um) comprimido de 57 mg

O medicamento não possui atividade persistente. Para prevenir reinfestações, recomenda-se um tratamento adequado para controlar os estádios imaturos do ciclo de vida da pulga. O médico veterinário deve estabelecer um regime de tratamento adequado.

TOLERABILIDADE: Em estudos de segurança realizados com o nitempiram, utilizando o dobro da dose terapêutica recomendada em bula, não foram observados sinais clínicos alterados ou efeito colateral nos animais avaliados. O nitempiram tem demonstrado ser bem tolerado quando administrado a cães e gatos para eliminação de pulgas adultas.

REAÇÕES ADVERSAS: Em estudos realizados não foi observado nenhum tipo de reação adversa.

CONTRAINDICAÇÕES: O nitempiram não deve ser administrado em animais com sensibilidade conhecida ao ativo da fórmula. Não é recomendável a utilização deste medicamento em: cães com menos de 12 meses de idade, gatos com menos de 8 meses de idade, cadelas e gatas prenhes ou lactantes e cães e gatos machos destinados à atividade reprodutiva.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não é conhecida nenhuma incompatibilidade com outros compostos utilizados no combate de pulgas e carrapatos.

SUPERDOSAGEM: Em caso de superdosagem, efeitos secundários como salivação, vômitos, fezes moles, convulsões ou redução de atividade podem ser observados. Um médico veterinário deve ser consultado para instituir o tratamento sintomático, não existe antídoto específico.

PRECAUÇÕES: Armazenar e manter o medicamento em local seco, fresco e ao abrigo da luz, em temperatura entre 15 °C e 30 °C. Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido. Seguir corretamente as indicações e instruções para o uso. Armazenar e manter o medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir. Seguir corretamente as indicações e instruções para o uso. Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.

PRODUTO SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÕES: Cartucho de papelão contendo 1, 10 ou 20 blísters com 1 ou 6 comprimidos cada.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 000007-8.000005 em 26/06/2019.

Proprietário:
Laboratórios Vencofarma do Brasil Ltda.
Travessa Dalva de Oliveira, 237 - Parque das Indústrias Leves
CEP: 86030-370 - Londrina, Paraná, Brasil
CNPJ: 79.578.266/0001-76 - Indústria Brasileira
SAC: 0800 400 7997 - www.dechra.com.br
Responsável Técnico: Dr. Jorge Chiromatzo Jr. CRMV-PR nº 1.850.

Fabricante:
Vansil Ind. Com. e Representações Ltda.
Rua João Augusto Cirelli, 640 - Distrito Industrial
CEP: 13690-000 - Descalvado-SP
CNPJ: 50.472.547/0001-68

Dechra

PRODUTOS

Vetaglós Pomada

Anti-infecciosa, epitelizante e cicatrizante

A fórmula de Vetaglós Pomada contém agentes antimicrobianos altamente eficazes no combate aos diversos micro-organismos que podem estar presentes nas infecções dermatológicas.

A Gentamicina é ativa contra *Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae*, espécies de *Proteus indol-positivas* e *indol-negativas*, *Pseudomonas aeruginosa*, algumas espécies de *Serratia* não pigmentada e muitas espécies de *Salmonella* e *Shigella*.

A Sulfanilamida e Sulfadiazina são ativas contra espécies de *Streptococcus*, *Proteus, Pasteurella* e *Salmon*
Também têm alta eficácia contra *Clostridium perfringens* e contra gêneros *Bacteroides* e *Fusobacterium*. A at
pela ureia presente na fórmula de Vetaglós Pomada.

Vetaglós Pomada possui também em sua fórmula a Vitamina A que tem extraordinária ação sobre o epitélio
mesmo.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Nos ferimentos superficiais de pele ou de difícil cicatrização;
Nos ferimentos infectados das regiões de articulações muito móveis;
Nas feridas e pisaduras infectadas, provocadas por selas e arreios;
Nas feridas ou escaras de decúbito infectadas, perdas epiteliais, lesões de escoriações, de coceiras do casco
Nas úlceras infectadas e purulentas, furúnculos e abscessos;
Nas queimaduras e erupções vesiculosas e varioliformes;
Nas dermatites (inflamação da pele) e rachaduras da pele;
Nas pododermatites necrosantes (necrobacilose dos cascos), como coadjuvante;
Na proteção das feridas cirúrgicas.

NÍVEL DE GARANTIA DO PRODUTO

Cada 100 g contém:
Gentamicina (Sulfato).....0,5 g
Sulfanilamida.....5,0 g
Sulfadiazina.....5,0 g
Uréia.....5,0 g
Vitamina A.....120.000 UI
Excipiente q.s.p.....100,0 g

MODO DE USAR

Aplicar uma fina camada, 1 a 2 vezes ao dia, após prévia limpeza das áreas afetadas.

O tratamento deverá ter continuidade por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

APRESENTAÇÃO

Bisnagas de 50 g e 20 g.

VEJA TAMBÉM

Simparic
(sarolaner)
Comprimidos Mastigáveis

Comprimidos mastigáveis para cães

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 1 g de produto contém:

Sarolaner ..... 40 mg

Excipiente q.s.p. ..... 1,0 g

DESCRIÇÃO:

SIMPARIC (Sarolaner) é um comprimido mastigável altamente palatável para administração em cães e filhotes de acordo com o peso corpóreo. Cada comprimido é formulado de forma a oferecer uma dosagem mínima de 2 mg/kg de sarolaner.

A substância ativa de **SIMPARIC**, sarolaner, é um acaracida e inseticida pertencente à classe de parasiticidas isoxazolina, sendo seu nome químico 1-(5'-((5S)-5-(3,5-Dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-

4,5-dihidroisoxazol-3-yl)-3'-H-spiro(azetidine-3,1'-(2)benzofuran)-1-yl)-2-(metilsulfonil)etanone. **SIMPARIC** contém o enantiômero S de sarolaner. A estrutura química do enantiômero S de sarolaner é:



INDICAÇÕES:

SIMPARIC é indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides felis* e *Ctenocephalides canis*) e tratamento e controle de infestações por carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum*, *Amblyomma maculatum*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica*).

SIMPARIC é também indicado para o tratamento e prevenção de sarna causada por *Sarcoptes scabiei* e *Demodex canis* e também, para o tratamento e prevenção de *Otodectes cynotis* (*ácaro da orelha*).

SIMPARIC comprimidos mastigáveis auxilia na prevenção da transmissão de *Borrelia burgdorferi* (Doença de Lyme) e *Anaplasma phagocytophilum* pelo carrapato *Ixodes scapularis,* e *Babesia canis* pelo carrapato *Dermacentor reticulatus*.

ADMINISTRAÇÃO:

SIMPARIC comprimidos mastigáveis são administrados por via oral, uma vez por mês, na dosagem m**ínima recomendada de** 2 mg/kg.

Posologia:

Peso	Sarolaner por comprimido (mg)	Número de comprimidos a serem administrados
1,3-2,5 kg	5	1
2,6-5 kg	10	1
5,1-10 kg	20	1
10,1-20 kg	40	1
20,1-40 kg	80	1
40,1-60 kg	120	1
>60 kg	Administrar a combinação apropriada de comprimidos	

SIMPARIC é um comprimido mastigável altamente palatável, facilmente consumido pelos cães quando oferecido pelo proprietário. **SIMPARIC** também pode ser oferecido na comida.

O tratamento com **SIMPARIC** pode iniciar em qualquer época do ano e continuar durante o mesmo sem interrupção.

Para diminuir a probabilidade de reinfestações de pulgas, carrapatos ou ácaros é importante tratar todos os cães e gatos dentro de um mesmo domicílio com um produto aprovado.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- Não existem contra-indicações conhecidas para o uso de **SIMPARIC** comprimidos mastigáveis.
- O uso seguro de **SIMPARIC** não foi avaliado em cadelas reprodutoras, prenhes ou lactantes.
- Não deve ser utilizado em humanos e gatos. Lavar as mãos após manusear os comprimidos.

EFEITOS COLATERIAIS:

Não há reações adversas graves atribuídas à administração de **SIMPARIC** na dose recomendada de 2 mg/kg. Em um estudo de segurança controlado em que cães de 8 semanas de idade receberam até 5 vezes a dose recomendada de 2mg/kg, mensalmente, durante 9 meses, vômito, diarreia, letargia e perda de apetite foram notados em menos de 1% dos animais tratados com **SIMPARIC**.

FARMACOLOGIA CLÍNICA:

Sarolaner é absorvido bem e rapidamente após a administração oral, com meia-vida média de 12 dias.

Modo de ação:

Isoxazolinas são potentes inibidores do receptor do neurotransmissor ácido gama aminobutírico (GABA) e do receptor de glutamato e agem na junção neuromuscular dos insetos. Isto resulta em atividade neuromuscular descontrolada levando à morte rápida de insetos ou ácaros. Sarolaner tem grande afinidade por receptores GABA de insetos e isso aumenta a segurança em mamíferos como os cães.

EFICÁCIA:

Controle de Carrapatos

Rhipicephalus sanguineus: Uma única dose oral de SIMPARIC resultou em 100% de eficácia dentro de 48 horas contra infestação existente e 100% de eficácia contra reinfestações semanais com *R. sanguineus* por até 35 dias após o tratamento. Assim, **SIMPARIC** administrado uma vez por via oral na dose de 2 mg/kg promoveu o tratamento e controle de carrapatos *R. sanguineus* por pelo menos um mês.

Em estudos controlados em laboratório, **SIMPARIC** demonstrou pelo menos 99,4% de eficácia 48 horas após a administração da dose contra infestações existentes de 10 espécies de carrapatos (*Ambylomma americanum*, *Ambylomma maculatum*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus, Ixodes holocyclus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis elliptica*). Além disso, a eficácia de pelo menos 97,1% foi mantida contra reinfestações semanais de todas as espécies por 35 dias.

Em outro estudo controlado realizado em laboratório para avaliar a velocidade de eficácia acaricida contra *I. scapularis,* **SIMPARIC** demonstrou ter rápido início de eficácia com redução significativa

na média geométrica de contagem de carrapatos vivos dentro de 8 horas após o tratamento. Além disso, promoveu redução de 99,2% até 12 horas depois do tratamento. Em reinfestações subsequentes, a contagem de carrapatos vivos foi reduzida significativamente até 12 horas e ≥97,2% de eficácia foi alcançado dentro de 24 horas por 28 dias.

Controle de Pulgas

Em estudo controlado em laboratório, **SIMPARIC** comprimidos mastigáveis foi capaz de reduzir a contagem de pulgas adultas dentro de 3 horas após a administração e alcançou 100% de eficácia em 8 horas. **SIMPARIC** continuou a demonstrar ≥96,1% de eficácia após reinfestações por 35 dias.

Em outro estudo de laboratório, **SIMPARIC** demonstrou 100% de eficácia dentro de 24 horas após o tratamento e manteve 100% de eficácia contra reinfestações semanais por 35 dias.

Em estudo para explorar a produção dos ovos de pulgas e a sua viabilidade, **SIMPARIC** reduziu em 100% a produção de ovos de pulgas em uma infestação já existente e reinfestações semanais por 35 dias.

Cães com sinais de dermatite alérgica por pulga apresentaram melhora em eritema, pápulas, escamação, alopecia, dermatite/piodermite e prurido como resultado direto da eliminação de pulgas dos animais e do seu ambiente.

Controle de Ácaros

Em estudo de campo, duas administrações orais mensais de SIMPARIC na dosagem de 2 a 4 mg/kg foram seguras e altamente eficazes contra infestações naturais de *S. scabiei* em cães. Houve cura parasitológica de 100% e redução marcante dos sinais clínicos de sarna sarcóptica após o segundo tratamento.

Em outro estudo, doses orais mensais de **SIMPARIC** administradas a 2 mg/kg em cães que adquiriram demodicidose naturalmente reduziram significativamente as contagens de ácaros até >90% em relação a contagem pré-tratamento no prazo de 14 dias após a primeira dose (*P*0,0001). Redução superior a 99% na contagem de ácaros foi conseguida até o Dia 29. A partir do Dia 44, todos os cães tratados com **SIMPARIC** obtiveram zero contagem de ácaros (100% de eficácia).

Em estudo controlado conduzido para avaliar a eficácia de **SIMPARIC** contra o ácaro da orelha, uma única dose oral com **SIMPARIC** reduziu a contagem total do ácaro *O. cynotis em* até 98,2% dentro de 30 dias após a administração do comprimido, sem qualquer evento adverso relacionado ao tratamento.

SEGURANÇA:

Em estudo de segurança conduzido com o produto, **SIMPARIC** foi administrado por via oral em cães de 8 semanas de idade em doses de 0, 1, 3, e 5 vezes a dose máxima recomendada (4 mg/kg) em intervalos de 28 dias para 10 doses. Cães do grupo controle receberam comprimidos placebo. No geral, o produto foi bem tolerado. Sinais neurológicos transitórios foram observados em duas fêmeas que receberam 5 vezes a dose; um cão teve convulsão 24 horas após a segunda e quarta doses e um segundo cão teve convulsão leve 5 dias após a terceira dose. Ambos os cães se recuperaram sem tratamento. Nenhum sinal neurológico foi observado no grupo que recebeu uma dose. Quase todos os sinais neurológicos foram observados durante o período de administração das 4 primeiras doses.

Em estudo de campo controlado, **SIMPARIC** foi utilizado concomitantemente com outros medicamentos tais como antiinflamatórios, antibióticos, imunossupressores e esteroides. **Não foram observadas reações adversas do uso concomitante de SIMPARIC** comprimidos mastigáveis com outros medicamentos.

APRESENTAÇÃO:

SIMPARIC comprimidos mastigáveis está disponível em 6 tamanhos de comprimidos palatáveis: 5, 10, 20, 40, 80 e 120 mg. Cada tamanho de comprimido está disponível em embalagens com um, três ou seis comprimidos.

Manter for do alcance de crianças e animais domésticos.

Armazenar em temperatura ambiente (15°C – 30°C)

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.181/2016 em 23/02/2016

Responsável Técnico: Renato Beneduzzi Ferreira CRMV SP nº 1.695

Proprietário:
Zoetis Inc.
333 Portage St
Kalamazoo, MI - EUA

Fabricado por:
Zoetis LCC
601 W Cornhusker HWY
Lincoln, NE – EUA

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:
Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701
CEP 13064-798, Campinas – SP
CNPJ nº 43.588.045/0001-31

SAC 0800 011 1919

PRODUTO IMPORTADO

zoetis

50091700

Trissulmax Injetável

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA: Cada 100 mL do produto contém:

Sulfadoxina ---------- 20,00 g

Trimetoprim ---------- 4,00 g

Água estéril q.s.p. ---------- 100,00 mL

INDICAÇÕES: TRISSULMAX INJETÁVEL é uma associação que possui amplo espectro de ação, atuando em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, sendo sua principal indicação para animais domésticos, em infecções do:

Sistema respiratório: pneumonias, bronquite infecciosa e infecções bacterianas secundárias às infecções virais, causadas por *Streptococcus sp, Pasteurella multocida, Haemophilus sp, Pseudomonas sp, Bordetella bronchiseptica.*

Sistema digestivo: diarreias causadas por *Escherichia coli, Salmonella sp.*

Sistema genito-urinário: vaginites, metrites, preventivo de infecções pós-parto, cistites, nefrites causadas por *Streptococcus sp, Staphilococcus sp, Corynebacterium pyogenes, Proteus mirabillis.* Preventivo em pós-operatório; outras infecções como: feridas diversas, mastites, poliartrites, por *Streptococcus sp, Corynebacterium sp, Klebsiella sp.*

Espécies a que se destina: bovinos e caninos.

DOSAGEM: Dosagem do produto em mg por kg.

Dose: 10-15 mg/kg (equivalente a 1 mL/16 kg).

DURAÇÃO DO TRATAMENTO: A duração do tratamento dependerá da patologia e ficará a critério do médico veterinário. Recomendada a continuidade do tratamento por até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Intravenosa, intramuscular e subcutânea.

CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS: Esta combinação deve ser utilizada com cautela em pacientes com doença hepática ou renal pré-existente. Pode ocorrer toxicidade crônica das sulfas, ocorrendo a cristalúria sulfonamídica, sendo esse efeito relacionado com a precipitação das sulfas e principalmente de seus metabólitos acetilados nos túbulos contornados renais, sendo os principais sinais clínicos: diminuição da micção e dor, hematúria e cristalúria; reações de toxicidade aguda podem seguir a injeção intravenosa rápida, com sintomas de hipersensibilidade, sinais neurológicos, êmese, ataxia, debilidade muscular, paresia espástica e convulsões.

PRECAUÇÕES: Obedecer as dosagens indicadas para o uso do produto. A administração intravenosa deve ser realizada lentamente. Hidratação do paciente: o animal deverá ter livre acesso à água quando receber tratamento sulfonamídico.

Evitar tratamentos prolongados. Não administrar o produto com prazo de validade vencido. Não administrar em aves cujos ovos são destinados ao consumo humano. Armazenar e manter o medicamento em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Seguir corretamente as indicações e instruções para o uso. Armazenar e manter o medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 42 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
BOVINOS: LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 11 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

APRESENTAÇÃO: Frasco-ampola de vidro contendo 5, 10, 20, 30 ou 50mL, acondicionados em cartuchos individuais ou em caixas de papelão contendo 5, 10, 20 ou 50 unidades acompanhados de bulas individuais.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB A ORIENTAÇÃO *DO MÉDICO* VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.864 em 07/05/04.

Proprietário e fabricante:
Dechra Brasil Produtos Veterinários Ltda.
Travessa Dalva de Oliveira, 237 - Parque das Indústrias Leves
CEP: 86030-370 - Londrina, Paraná, Brasil
CNPJ: 79.578.266/0001-76 - Indústria Brasileira
SAC: 0800 400 7997 - www.dechra.com.br
Responsável Técnica: Drª. Vera Lúcia Fernandes.
CRMV-PR nº 3.014.

Dechra

19-3593-9999 | sac@vansil.com.br

Busque por produtos

Início > Animais de produção > Bovinos > Unguento Vansil

Unguento Vansil

Tradição e eficácia na cicatrização

O cuidado correto das feridas e lesões dos animais domésticos é essencial. Um tratamento bem feito acelera a recuperação do animal, além de prevenir bicheiras e o berne.

Unguento Vansil é uma pomada a base de Permetrina e Óxido de Zinco e que contém dois princípios ativos eficazes no controle de insetos e larvas de parasitos.

DESCRIÇÃO

Tradição e eficácia na cicatrização

O cuidado correto das feridas e lesões dos animais domésticos é essencial. Um tratamento bem feito acelera a recuperação do animal, além de prevenir bicheiras e o berne.

Unguento Vansil é uma pomada a base de Permetrina e Óxido de Zinco e que contém dois princípios ativos eficazes no controle de insetos e larvas de parasitos.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Butóxido de Piperonila 3,5 g

Permetrina	0,5 g
Óxido de Zinco	20 g
Veículo q.s.p.	100 g
Apresentação:	Pote com 50 g e 250 g.

INDICAÇÕES

Unguento Vansil está indicado para bovinos, ovinos, suínos, caprinos e equinos nas seguintes situações: descornas, marcações, arranhaduras, castrações, cura de umbigo de recém-nascidos, cirurgias, bicheiras e ferimentos em geral. Indicado como repelente para as moscas causadoras das miíases (bicheiras) e para os insetos que transportam os ovos da mosca do berne.

MODO DE USAR

Via de administração: Tópico. Higienizar o local com o auxílio de uma compressa de gaze e aplicar o Unguento Vansil. Repetir a aplicação diariamente até completa cicatrização da ferida. O excesso deve ser removido antes da aplicação da pomada nas reaplicações. O produto deve ser aplicado durante todo o tempo que se fizer necessário a fim de se obter uma perfeita cura. Alterações na posologia e modo de uso a critério do Médico Veterinário.

Inscreva-se e receba novidades

INSTITUCIONAL

Sobre a Vansil
Política de qualidade
Downloads
Notícias
Blog
Trabalhe Conosco

VANSIL SAÚDE ANIMAL

RUA JOÃO AUGUSTO CIRELLI, 640
DESCALVADO – SP, CEP 13690-000

SAC 19 3593-9999

suspensão

Petzi plus

USO VETERINÁRIO

VERMÍFUGO ORAL DE AMPLO ESPECTRO PARA CÃES

DOSE ÚNICA

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Pamoato de Pirantel.....1,45 g
(Equivalente a 0,5 g de pirantel base)
Pamoato de Oxantel.....3,80 g
(Equivalente a 2,0 g de oxantel base)
Praziquantel 0,50g
Excipiente q.s.p.....100,00 mL

INDICAÇÕES:

PETZI PLUS SUSPENSÃO é um vermífugo de amplo espectro indicado para o combate dos principais nematódeos (inclusive *Trichuris vulpis*) e cestódeos que infestam os cães, a saber:

Nematódeos:
- *Ancylostoma caninum*
- *Ancylostoma braziliense*
- *Toxocara canis*
- *Toxascaris leonina*
- *Trichuris vulpis*

Cestódeos:
- *Dipylidium caninum*
- *Taenia multiceps*
- *Taenia psiformis*
- *Taenia hydatigena*
- *Taenia ovis*
- *Echinococcus granulosus*
- *Echinococcus multilocularis*

Para evitar reinfestações por *Dipylidium caninum*, aconselha-se que, paralelamente ao uso de **PETZI PLUS SUSPENSÃO**, o proprietário combata as pulgas do ambiente, eliminando assim a ação do hospedeiro intermediário desta teníase.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

PETZI PLUS SUSPENSÃO deve ser administrado diretamente por via oral, utilizando o dosificador que acompanha o produto. O uso de **PETZI PLUS SUSPENSÃO** não compromete a rotina do animal, não havendo necessidade de jejum prévio e/ou qualquer alteração na dieta. Em infestações maciças por toxocaríase e ancilostomíase, administrar a dose preconizada, durante 3 dias consecutivos. Repetir este esquema após 15 dias.

AGITE ANTES DE USAR

POSOLOGIA:

Dose única.
- 5 mg de pirantel base por kg de peso.
- 20 mg de oxantel base por kg de peso.
- 5 mg de praziquantel base por kg de peso.

Esta dose é alcançada mediante a administração de 1 (um) mL de **PETZI PLUS SUSPENSÃO** por kg de peso. Cães com peso inferior a 500 g, administrar ½ (meio) mL. O doseamento é facilmente conseguido através da utilização do dosificador que acompanha o produto. Qualquer alteração de posologia e modo de usar, bem como a freqüência de tratamentos, fica a critério e responsabilidade do Médico Veterinário.

CALENDÁRIO DE VERMIFUGAÇÃO SUGERIDO:

FILHOTES: Realizar três vermifugações, na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida.
CADELAS: Vermifugar na cobertura, uma semana antes do parto e 3 semanas após o parto, juntamente com a 1ª vermifugação dos filhotes.
CÃES ADULTOS: Vermifugar a cada 3 (três) ou 6 (seis) meses, conforme orientação do Médico Veterinário. Repetir após 15 dias.

APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 20 mL, acompanhado de dosificador graduado.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 5.576 em 10/07/96.
Responsável Técnico:
Dr. Cassio R. Murin - CRMV-SP nº 6473.

Proprietário e Fabricante:
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do Grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13148-115 - Paulínia - SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05
E-mail: cevabrasil@ceva.com
Indústria Brasileira

ceva

CEVA SAC:
0800-770-0355
sac@ceva.com

P 10182 V06